

Vážení čtenáři, předložený autodidaktický test ověří, jak pečlivě jste pročetli publikované články. Test se skládá ze 12 otázek, na každou existuje alespoň jedna správná odpověď, řešení najdete v jeho závěru. Přejeme Vám hodně zábavy a především pocit uspokojení z výsledku.

1 Který z následujících rehydratačních roztoků je nevhodný pro úvod k parenterální rehydrataci u těžké dehydratace:

- a) 1/1 fyziologický roztok
- b) 1/1 Ringer
- c) 1/3 fyziologický roztok
- d) 6% hydroxyetylškrob

2 Mezi makrolidová antibiotika nepatří:

- a) tylosin
- b) spiramycin
- c) klindamycin
- d) telitromycin

3 U pacienta s virovou keratokonjunktivitidou a sníženou transparenčí rohovky:

- a) okamžitě nasazujeme kortikoidy, protože hrozí prohloubení defektu
- b) nemusíme zahajovat léčbu, protože virová onemocnění předního segmentu oka odeznívají i bez terapie
- c) indikujeme promptní oftalmologické vyšetření/konzilium
- d) virová keratokonjunktivitida se sníženou transparenčí rohovky jako patologická jednotka neexistuje

4 Kojení prvních 6 měsíců (popřípadě hydrolyzované náhradní mléko) má příznivý antialergický vliv:

- a) jen na atopickou dermatitidu a potravinovou alergii
- b) jen na senzibilizaci (představovanou vyššími hladinami specifických IgE)
- c) jen na astma a alergickou rýmu
- d) na vše výše uvedené – na znaky a projevy všech alergických onemocnění

5 Oxygenoterapie je důležitá léčebná metoda pro děti s BPD, jejíž účinek spočívá v tom, že:

- a) zvyšuje centrální respirační stabilitu a odstraňuje fragmentaci spánku
- b) zvyšuje plicní arteriální rezistenci
- c) proud kyslíku v nostrilách zvyšuje minutovou plicní ventilaci
- d) zlepšuje dostupnost kyslíku ve tkáních pro aktivitu a růst

6 Mezi nejvarovnější příznaky možné sekundární bolesti hlavy u dětí patří:

- a) ložiskový neurologický nález

- b) ranní zvracení
- c) městnavá papila
- d) negativní rodinná anamnéza

7 Vyberte správné tvrzení:

- a) klíšťová encefalitida (KE) se projeví v I. fázi onemocnění vznikem erytema migrans v místě přisátí klíštěte
- b) v průběhu KE jsou v laboratorních nálezech v I. fázi leukopenie, ve II. fázi leukocytóza
- c) průkaz původce se provádí izolací viru z mozkomíšního moku na tkáňových kulturách
- d) průkaz původce onemocnění se provádí vyšetřením protilátek v séru a mozkomíšním moku

8 Dítě odesíláme do endokrinologické ordinace tehdy, když:

- a) je obézní a babička má něco se štítnou žlázou
- b) má hladinu TSH 4,6 mIU/l (norma laboratoře do 4,2 mIU/l)
- c) hladina TSH je v normálním referenčním rozmezí
- d) hladina TSH je opakovaně nad 8 mIU/l

9 Kolik dětí s hypertenzí v ČR splňuje kritéria obezity:

- a) 33 %
- b) 43 %
- c) 53 %
- d) 63 %

10 K objasnění etiologie pneumonie vyšetřujeme:

- a) výtěr z krku
- b) výtěr z nosu
- c) hemokulturu
- d) C reaktivní protein

11 Podání Torecanu tbl. (thietylperazinu) jako antiemetika je kontraindikováno:

- a) u dětí do 2 let
- b) u dětí do 15 let
- c) u dětí nad 15 let
- d) při podezření na Reyeův syndrom

12 Které makrolidové antibiotikum není nutné podávat v závislosti na jídle?

- a) azitromycin
- b) spiramycin
- c) klaritromycin
- d) erytromycin

Správně odpovědi: 1. c, 2. c, 3. c, 4. a, 5. a, d, 6. a, b, c, 7. b, d, 8. d, 9. c, 10. c, 11. a, b, d, 12. c