

» PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY

INFEKCE SARS-COV-2 A NOVOROZENCI

tak, že lze uvažovat o léčebném efektu protilátek od matky nebo obsažených v dárcovské plazmě, kterou dostalo opakovaně. V 1. roce mělo dítě přiměřený růst a vývoj odpovídající jeho věku a významné prematuritě.

LITERATURA

1. Beesley MA, Davidson JR, Panariello F, et al. COVID-19 and vertical transmission: assessing the expression of ACE2/TMPRSS2 in the human fetus and placenta to assess the risk of SARS-CoV-2 infection. *BJOG*. 2022;129(2):256-266.
2. Blumberg DA, Underwood MA, Hedriana HL, et al. Vertical Transmission of SARS-CoV-2: What is the Optimal Definition? *Am J Perinatol*. 2020;37(8):769-772.
3. Peng Z, Zhang J, Shi Y, et al. Research progresses in vertical

Doporučení jak pečovat o novorozence covid-19 pozitivních rodiček:

Onemocnění covidem-19 matky by nemělo ovlivnit způsob porodu, kojení či postnatální kontakt matky a dítěte (8).

4. Jamieson DJ, Rasmussen SA. An update on COVID-19 and pregnancy. *Am J Obstet Gynecol*. 2022;226(2):177-186.
5. Joma M, Fovet CM, Seddiki N, et al. COVID-19 and Pregnancy: Vertical Transmission and Inflammation Impact on Newborns. *Vaccines (Basel)*. 2021;9(4):391.
6. Ryan L, Plötz FB, van den Hoogen A, et al. Neonates and

- Dítě má být kojeno !!! (ev. odstříkané mléko, je-li matka oddělena).
- Matka má nosit roušku.
- Personál dodržuje bariérový protiepidemický režim.

7. Cheema R, Partridge E, Kair LR, et al. Protecting Breastfeeding during the COVID-19 Pandemic. *Am J Perinatol*. 2023;40(3):260-266.
8. WHO Frequently Asked Questions: Breastfeeding and COVID-19 For health care workers. *J Hum Lact*. 2020;36(3):392-396.



ČASOPISY

SUPPLEMENTA
REPRINTY

TIŠTĚNÁ FORMA

SOLEN
MEDICAL EDUCATION

**Komunikujeme
s lékaři všemi
směry**

INTERNET

OSOBNÍ KONTAKT

KNIHY

EDUKAČNÍ MATERIÁLY
BROŽURY

SEMINÁŘE
AKCE NA KLÍČ

KONGRESY



E-SHOP, ARCHIV ČLÁNKŮ,
ON-LINE VZDĚLÁVÁNÍ

ON-LINE