

KLINICKORADIOLOGICKÁ DIAGNÓZA

- 183** prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., MUDr. Bohumil Zálešák, Ph.D., MUDr. Daniel Stehlík, MUDr. Patrik Flodr, Ph.D.
Pyogenní granulom (lobulární kapilární hemangiom) u 4leté dívky po ukončení léčby akutní lymfoblastické leukemie

PRO SESTRY

- 187** PhDr. Ľubomíra Karol'ová, prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD., MPH
Bonding – vzťah podporujúci dojčenie

NEKROLOG

- 190** MUDr. Nabil El-Lababidi
Vzpomínka na MUDr. Pavla Frühaufa, CSc.


QuikRead go®

Rychlý, multifunkční, plně automatizovaný POCT analyzátor.
Výsledky jako z laboratoře
(metoda imunoturbidimetrie).



Xeliac® Test

pro detekci protilátek třídy
IgA, IgG a IgM proti tkáňové
transglutamináze.



- Vysoká citlivost (96,5 %) a specificita (97,3 %)
- Stanovení nejen IgA (IgA, IgG, IgM anti-tTG)
- Součástí balení jsou i lancety
- Test z plné krve/séra
- Podpora diagnostiky u dětí i dospělých