



# I jizvy lze léčit efektivně!

Podpořte fyziologický proces hojení jizev.

Pro dosažení minimální viditelnosti jizev doporučujte svým pacientům Contractubex® hned od počátku léčby. I jizvy lze léčit efektivně.

## Contractubex®

- **léčba na základě oficiálních guidelines<sup>1</sup>**
- **trojí účinek:** zabraňuje nadměrnému zjazvení, zlepšuje pružnost a měkkost jizvy a zmírňuje zarudnutí a svědění
- **signifikantní výsledky potvrzeny klinickými studiemi<sup>2</sup>**
- **u dětí od 1 roku věku může být přípravek aplikován na jizvy jednou či dvakrát denně, na základě provedených studií**

[www.contractubex.cz](http://www.contractubex.cz)

Contractubex® gel je léčivý přípravek ke kožnímu podání.

1 Gold MH et al. Updated International Clinical Recommendations on Scar Management. Dermatol Surg 2014;40:817–824 (gel included in the recommendations).

2 Willital GH, Simon J. Efficacy of Early Initiation of a Gel Containing Extractum Cepae, Heparin, and Allantoin for Scar Treatment: An Observational, Noninterventional Study of Daily Practice. J Drugs Dermatol 2013;12:38–42 (conducted with the gel).

### Zkrácená informace o přípravku

**Název přípravku:** Contractubex gel. **Složení:** 100 g gelu obsahuje: 10 g extraktu z Allium Cepa L., bulbus (cibule kuchyňské cibule) (0,16:1), extrakční rozpouštědlo: voda, heparinum natrium 40,0 mg (odp. 5000 IU), allantoinum 1,0 g. **Indikace:** Hypertrofičké, keloidní, pohyb omezující a opticky rušící jizvy po operacích, amputacích, popáleninách a úrazech; trvalé kontraktury jizev, jako např. Dupuytrenova kontraktura, a traumatické kontraktury šlach, nebo při retraktaci jizev (atrofičké jizvy). Contractubex se používá vždy až po uzavření léze. **Dávkování a způsob podání:** V tenké vrstvě několikrát denně se gel nanese na kůži a jizevnatou tkáň a jemně vmasíruje. Do úplné absorpce. U keloidů a starých jizev se gel nechá působit přes noc pod obvazem. Léčba trvá několik týdnů až měsíců. **Kontraindikace:** Hypersenzitivita na léčivou nebo kteroukoli pomocnou látku přípravku. **Zvláštní upozornění a opatření pro použití:** Přípravek obsahuje ethylparaben (riziko zpožděné alergické reakce); kyselinu sorbovou (riziko kožní reakce, např. kontaktní dermatitidy); parfém s alergenními vonnými látkami (citronelol, geraniol, benzylalkohol, citral a linalool); alkohol. **Interakce:** Studie nebyly provedeny. **Těhotenství a kojení:** Riziko v době těhotenství a kojení není známo. **Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje:** Neuvádí se. **Nežádoucí účinky:** Pruritus, erytém, teleangiektazie, atrofie jizvy. Přípravek je obecně velmi dobře snášen i při dlouhodobém použití. **Druh obalu a velikost balení:** Zaslepená hliníková tuba s vnitřním lakem a s HDPE šroubovacím uzávěrem, krabička. Balení: 20 g, 50 g a 100 g. **Doba použitelnosti:** 2 roky. Po prvním otevření 6 měsíců. **Zvláštní opatření pro uchovávání:** Při teplotě do 25°C. **Držitel rozhodnutí o registraci:** Merz Pharmaceuticals GmbH, Eckenheimer Landstraße 100, 60318 Frankfurt/Main, Německo. **Registrační číslo:** 46/753/97-C. **Datum registrace/prodloužení registrace:** 10.9.1997./3.7.2014. **Datum poslední revize textu:** 20.10.2023. **Přípravek je volně prodejný. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Seznamte se, prosím, s podrobnými informacemi v platném Souhrnu údajů o přípravku nebo na adrese společnosti DESITIN PHARMA, spol. s r.o., Opletalova 25, 110 00 Praha 1, Czech Republic, [www.desitin.cz](http://www.desitin.cz)**

Poslední revize textu: 20.10.2023

10/2024 Contractubex  
Datum přípravy: říjen 2024

DESITIN PHARMA, spol. s r.o.  
Opletalova 25, 110 00 Praha 1  
[www.desitin.cz](http://www.desitin.cz)  
tel.: + 420 222 245 375

