



# ZAČÍNÁJÍCÍ BOLEST V KRKU?

## ÚLEVA OD BOLESTI UŽ PO 5 MINUTÁCH + NIČÍ VIRY, BAKTERIE A KVASINKY

NEJDŮVĚRYHODNĚJŠÍ ZNAČKA: Anketa byla realizována společností Atoz Marketing Services, spol. s r. o., v rámci programu Důvěryhodné značky ve spolupráci s výzkumnou agenturou Nielsen. Hodnocení proběhlo na základě spotřebitelského průzkumu, tvořeného 4000 respondenty. Důvěryhodné značky jsou novým a jediným marketingovým programem na českém trhu, který monitoruje a oceňuje značky, ve které mají čeští spotřebitelé největší důvěru.

### ZÁKLADNÍ INFORMACE O PŘÍPRAVKU PODLE SCHVÁLENÉHO SPC

Strepsils Med a Citron

Složení: Léčivé látky: 1 pastilka obsahuje amylmetacresolum 0,6 mg, alkohol 2,4-dichlorobenzyllicus 1,2 mg. Indikace: k symptomatické léčbě zánětlivých a infekčních onemocnění dutiny ústní a hltanu a k úlevě od bolesti v krku. Dávkování a způsob podání: Orální podání. Pastilky nechat rozpustit v ústech. Přípravky se nemají používat těsně před jídlem nebo během jídla. Dospělí: Každé 2-3 hodiny 1 pastilku. Maximálně 12 pastilek v průběhu 24 hodin. Dospívající a děti starší 6 let: každé 2-3 hodiny 1 pastilku. Maximálně 6 pastilek v průběhu 24 hodin. Kontraindikace: hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku. Přípravek není v období těhotenství a kojení doporučen. Podávání dětem do 6 let. Upozornění: Přetrvávají-li příznaky onemocnění déle než 3 dny nebo vyskytne-li se horečka, je nutné vyhledat lékaře. Přípravky jsou určeny ke krátkodobé léčbě (při delším používání může dojít k narušení rovnováhy běžné mikroflóry ústní dutiny a k nebezpečí přemnožení patogenních mikroorganismů). Přípravek se nemá používat v případě větších akutních ran v oblasti dutiny ústní a hltanu. Přípravek obsahuje

glukózu a sacharózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktózy, malabsorpcí glukózy a galaktózy nebo sacharózo-izomaltázové deficienci nemají tento přípravek používat. Těhotenství a kojení: Přípravek nebyl testován na bezpečnost v průběhu těhotenství a kojení, a proto není v období těhotenství a kojení doporučen. Interakce: Při současném používání s dalšími lokálními antiseptiky nebo antibiotiky může dojít k prohloubení antimikrobiálního účinku. Nežádoucí účinky: není známo: mohou se objevit hypersenzitivní reakce, vyrážka, bolest břicha, nauzea, nepříjemný pocit v ústech. Držitel rozhodnutí o registraci: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o. Vinohradská 2828/151, Praha 3, 130 00 Česká republika. Registrační číslo: 69/372/92-S/C. Podmínky uchovávání: Pastilky uchovávat při teplotě do 25 °C. Datum revize schváleného SPC: 23.12.2021. **Výdej léčivého přípravku není vázán na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Dříve než léčivý přípravek doporučíte nebo předepíšete si, prosím, pečlivě přečtěte úplný souhrn údajů o přípravku (SPC). Pro další informace kontaktujte: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, tel.: +420 227 110 141. Datum vypracování materiálu: prosinec 2024.**

URČENO ODBORNÍKŮM