NUTRILON®
PROfutura
CESARBIOTIK™

Speciálně vyvinutá **receptura se synbiotiky**[1,2] **pro děti narozené císařským řezem**, které nemohou být kojeny

ROZVOJ STŘEVNÍ MIKROBIOTY A PODPORA IMUNITNÍHO SYSTÉMU[3-23]





PREBIOTIKA

scGOS/lcFOS (9:1)

> klinicky prokázané snížení rizika infekcí[3-6]

PROBIOTIKA

Bifidobacterium Breve M-16V

> klinicky prokázaný imunomodulační efekt[7,8]

HiMO 2'FL

> nejdominantnější HMO v mateřském mléce[9,10]

> prospěšný pro střeva a imunitu, **blokování růstu patogenů** ve střevě[11-13]

IMUNONUTRIENTY*

LCP (DHA & ARA)

Vitamíny C, D, E a zinek

> přispívají ke **správné funkci imunitního systému**[14-23]

HMO = oligosacharid mateřského mléka. **HiMO 2´FL** = Human-identical Milk Oligosaccharide = oligosacharid identický s oligosacharidem v mateřském mléce, 2´fukosyllaktóza.
*podle požadavků legislativy všechna počáteční mléka obsahují vitamíny C, D, E, zinek a kyselinu dokosahexaenovou (DHA)

REFERENCE: 1. Chua M, et al. JPGN, 2017;65:102-106. **2.** Lay C, et al. BMC microbiology. 2021. 21(1):191. **3.** Bruzzese E, et al. Clin Nutr. 2009;28(2):156-161. **4.** Arslanoglu S, et al. J Nutr. 2007;137:2420-2424. **5.** Chatchatee P, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2014;58(4):428-437. **6.** Arslanoglu S, et al. J Nutr. 2008;138:1091-1095. **7.** Van der Aa LB, et al. Clin Exp Allergy. 2010;40:795-804. **8.** Wong CB, et al. Nutrients. 2019;11(8). **9.** Thurl S, et al. Nutr Rev. 2017;75:920-933. **10.** Erney RM, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2000;30(2):181-192. **11.** Reverri EJ, et al. Nutrients. 2018;10(10):1346. **12.** Weichert S, et al. Nutr Res. 2013;33:831-838. **13.** Yu ZT, et al. J Nutr. 2016;146:1980-1990. **14.** Costantinie L, et al. Int J Mol Sci. 2017;18:2645. **15.** Hageman, et al. Curr Allergy Asthma Rep. 2012;2:564-573. **16.** Lassi ZS, et al. Cochrane Database Syst Rev. 2020;4(4). **17.** EFSA Journal, 2009;7(9):1229,34pp. **18.** EFSA Journal, 2014;12(5):3653,9pp. **19.** EFSA Journal, 2015;13(7):4182,9pp. **20.** EFSA Journal, 2015;13(11):4298,9pp. **21.** Carr AC, Maggini S. Nutrients. 2017;9(11):1211. **22.** Lewis ED, et al. IUBMB Life. 2019;71(4):487-494. **23.** Lee GY, Nim Han S. Nutrients. 2018;10(11):1614.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Kojení je pro dítě to nejlepší a zdravá a vyvážená strava matky je při kojení velmi důležitá. Rozhodnutí nekojit či přestat kojit může být nevratné. Počáteční kojenecká výživa je určena dětem od narození, pokud nemohou být kojeny. Kojenecká výživa by měla být používána na základě doporučení lékaře nebo osoby kvalifikované v oblasti výživy lidí, farmacie nebo péče o matku a dítě a měly by být zváženy i její finanční dopady. Pro zdraví kojence je důležité důsledně dodržovat doporučený postup přípravy a dávkování a použití kojenecké výživy uvedený na obale. Způsob použití a další informace na obalech. Potravina pro zvláštní výživu. **MATERIÁL JE URČENÝ POUZE PRO ODBORNOU VEŘEJNOST – NENÍ URČEN PRO PACIENTY ANI ŠIROKOU VEŘEJNOST.** 02/2023. BF312735