**Primární hyperoxalurie 1. typu (PH1):**
metabolické onemocnění s tvorbou kamenů, které může mít velmi těžké následky[1,2,4]

Alnylam® PHARMACEUTICALS

MEDISON

## PACIENTI S PRIMÁRNÍ HYPEROXALURIÍ (PH1) MOHOU MÍT JEDEN NEBO VÍCE Z NÍŽE UVEDENÝCH KLINICKÝCH PROJEVŮ:



**Recidivující urolitiázu[1]**



**Ledvinové kameny u dětí[4]**



**Nefrokalcinózu[1,2,3]**



**Neprospívání v raném dětství[4]**



**Progredující pokles renální funkce neznámé příčiny, který obvykle vyústí do ESRD*[1,2,3]**



**Rodinná anamnéza urolitiázy[3]**

**Přítomnost ledvinových kamenů je nejčastějším klinickým projevem, který vede k diagnóze primární hyperoxalurie 1. typu (PH1)[5]**

*** ESRD, terminální stádium renálního onemocnění**

**Určeno pouze pro zdravotnické pracovníky.**
**Vytvořeno a financováno společností Alnylam Pharmaceuticals.**

**Reference: 1.** Hoppe B. *Nat Rev Nephrol.* 2012;8(8):467–475. **2.** Cochat P, Rumsby G. *N Engl J Med.* 2013;369(7):649–658. **3.** Cochat P, Hulton SA, Acquaviva C, et al. *Nephrol Dial Transplant.* 2012;27(5):1729–1736. **4.** Milliner DS, Harris PC, Cogal AG, Lieske JC. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1283/. Updated November 30, 2017. Accessed April 14, 2021. **5.** Hoppe B, Langman CB. *Pediatr Nephrol.* 2003;18:986–991.

Kod: CZ-ALN-034-08/2025 | Datum přípravy: září 2025

**Medison Pharma s. r. o.**
Scott.Weber Workspace, Plynární 10/1617, 170 00 Praha 7
e-mail: office.czech@medisonpharma.com

BEHIND THE STONE™